

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成22年2月19日	使用開始日	平成22年4月1日
登録診療科	血液内科	申請医師	松永 一美
レジメン名	ABVd(少量)(ホスアプレビタント)		
疾患名	ホジキンリンパ腫	適応の備考	
適応分類	寛解導入療法		
1コース日数	28	日間 総コース数	8 コース 催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日	エクザール6mg/m ² 、ドキシソルピシン25mg/m ² 、プレオ9mg/m ² 、ダカルバジン250mg/m ² 各day1,15		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	ホスアプレビタント注150mg	1 本 / body	30分	●														●															
2	主ルート	ハロ/セトロン注バッグ0.75mg	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 2 本 / body	30分	● ●														● ●															
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	エクザール注	6 mg / m ²	30分	●														●															
最大投与量は10mg/回まで。																																		
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	ドキシソルピシン注	25 mg / m ²	30分	●														●															
総投与量は500mg/m ² まで																																		
5	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	プレオ注	9 mg / m ²	30分	●														●															
最大投与量は15mg/回まで。																																		
6	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	ダカルバジン注 注射用水100mL	250 mg / m ² 1 本 / body	2時間	● ●														● ●															
1V(100mg)あたり注射用水10mLで溶解する。希釈後は要遮光。																																		
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●														●															
	点滴静注																																	
8	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●														●															
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	1 本 / body	30分	●														●															
9	主ルート	生食100mL	1 本 / body			●	●												●	●														
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	2 本 / body	30分		●	●												●	●														

【投与上の注意】

- ・ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ホスアプレビタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- ・ダカルバジン:希釈後は要遮光。