レジメン登録フォーマット

| | ・ユッティク | 1 7 1 | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------|-------|---------------|--|---|----------|------|-----|---|--------------|----------|-----|-----|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|---|--|----------------|-------|----------|--|------------|---|----------|---------|---|---|----------|--------|--|--|--------|
| 申請年 | | | | 使用閉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 登録診療科 | | 血液内科 | | | 申請医師 | | | | | | L学療法委員会承認年月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レジメン | ノ名 | 高齢者AML(Ⅱ)地固め1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 疾患名 適応分類 | | 急性骨髄性白血病 | | '英 古 4 | 65歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 適応分類 | | 地固め療法 | | 適応の備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1コース日数 | | 14 | 日間 | 総コー | 8コース数 | | | 2 | | | | | コース | | | | 催吐性リスク | | | | | day1-3∶軽度、day₄ | | | | | | | 4-5:最小度 | | | | | | | |
| 抗がん | 剤投与量 | ・投与日 キロサイド80mg/m day | 1-5、ノ | バントロ | コン7mg | ∕m" o | day1- | .3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療ス | ケジュール | √・投与日程(投与日は ● |) | | | | | (day |) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 1 | 役 与 | 量 | 投与 | 時間 | 1 2 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 3 8 | 10 | 11 | 12 | 2 1 | 3 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 側管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T | Т | П | | | | | |
| | 上本転许 | グラニセトロン注バック 1mg/50mL | 1 | 本 | / body | 30 | 分 | • | • | • | • | | | | | | 1 | <u> </u> | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | |
| | 从问即注 | | | | / | | | | 1 | Ĭ | | | | - T | | · | 1 | <u> </u> | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 7 | 1 | | | | |
| | | | -4 | | | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 1 | 1 | | | | | | · | - | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | 1 | T | 1 | | | | | | | ****** |
| 2 | 側管 | 生食100mL ノバントロン注 | 1 | 本 | / body | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上海墊汁 | ノバントロン注 | 7 | mg | / m³ | 30 | 分 | • | | Ī | | <u></u> | | T | | T | | T | T | | | <u></u> | Ī | | | | T | | T | | | | | | | |
| | ****** | | | | / | | | | Ī | Ī | | <u></u> | | T | | T | | T | T | | | <u></u> | Ī | | | | T | | T | | | | | | | |
| | 70歳以上 | 歳以上は5mg/㎡へ減量 | | | | | | | | | | <u>-</u> | | T | | · · · · · | | · · · · · · | | | | <u>-</u> | | | | | Ī | | T | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食500mL | 1 | 本 | / body | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 精密持続 | キロサイド注 | 80 | mg | / body / m² | 24 | 時間 | • | | • | lacktriangle | <u></u> | | T | | T | | T | T | | | <u></u> | Ī | | | | T | | T | | | | | | | |
| | 静注 | | | | / | | | | | 1 | | | | | | | 1 | <u> </u> | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食50mL | 1 | 本 | / body | 5 | 分 | | | | | • | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | \Box | \Box | | | |
| | 点滴静注 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | T | Ī | | <u> </u> | | Ī | | 1 | <u> </u> | T | T | | | <u> </u> | | | | - 41 11 11 | Ī | Ī | | | | <u> </u> | | | | |
| | | | | | / | | | | T | Ī | | ···· | | Ī | <u> </u> | T | <u> </u> | T | T | | | ···· | | - | | | Ī | T | T | | | <u> </u> | | | | |
| | キロサイト | フラッシュ用 | -A | -1 | | | - | | 1 | Ţ | | | | T | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | <u> </u> | ···• | 1 | | | | ····· | ···· | | | 1 | <u> </u> | | | | 1 | | | | ······ |
| 715 / | - V 1 | | | | | | | | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | | | | _ | _ | | | | | | | | _ |

【投与上の注意】

キロサイド:大量投与時、結膜炎予防ためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。