

|                                                                                                                                                                    |                                   |                     |                          |                      |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 申請年月日                                                                                                                                                              | 平成30年5月14日                        |                     | 使用開始日                    |                      |                                                       |
| 登録診療科                                                                                                                                                              | 血液内科                              |                     | 申請医師                     | 上田 周二                |                                                       |
| レジメン名                                                                                                                                                              | CHASER                            |                     | 化学療法委員会承認年月              |                      | 平成 30 年 6 月                                           |
| 疾患名                                                                                                                                                                | 非ホジキンリンパ腫                         |                     | 適応の備考                    | CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 |                                                       |
| 適応分類                                                                                                                                                               |                                   |                     |                          |                      |                                                       |
| 1コース日数                                                                                                                                                             | 21 日間                             |                     | 総コース数                    | 3 コース                |                                                       |
|                                                                                                                                                                    |                                   |                     | 催吐性リスク                   |                      | day1:最小度、day3-5:中等度                                   |
| 抗がん剤投与量・投与日 リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> day1、エンドキサン1200mg/m <sup>2</sup> day2、エトポシド100mg/m <sup>2</sup> ・デキサメタゾン40mg/body 各day2-4、キロサイド2000mg/m <sup>2</sup> day3-4 |                                   |                     |                          |                      |                                                       |
| 治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)                                                                                                                                         |                                   |                     |                          |                      |                                                       |
| 投与順                                                                                                                                                                | ルート・方法                            | 薬剤名                 | 投与量                      | 投与時間                 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| 1                                                                                                                                                                  | 主ルート                              | 生食500mL             | 0.675 本 / m <sup>2</sup> |                      | ●                                                     |
|                                                                                                                                                                    | 点滴静注                              | リツキシマブ注             | 375 mg / m <sup>2</sup>  | 下記                   | ●                                                     |
|                                                                                                                                                                    | 10倍に希釈する。                         |                     |                          |                      |                                                       |
| 2                                                                                                                                                                  | 主ルート                              | グラニセトロン注バッグ1mg/50mL | 1 本 / body               |                      | ● ● ●                                                 |
|                                                                                                                                                                    | 点滴静注                              | デキサード注6.6mg         | 5 本 / body               | 60 分                 | ● ● ●                                                 |
| 3                                                                                                                                                                  | 主ルート                              | 生食500mL             | 1 本 / body               |                      | ●                                                     |
|                                                                                                                                                                    | 点滴静注                              | エンドキサン注             | 1200 mg / m <sup>2</sup> | 2 時間                 | ●                                                     |
|                                                                                                                                                                    | 閉鎖式システム使用                         |                     |                          |                      |                                                       |
| 4                                                                                                                                                                  | 主ルート                              | 生食500mL             | 1 本 / body               |                      | ● ●                                                   |
|                                                                                                                                                                    | 点滴静注                              | キロサイド注              | 2000 mg / m <sup>2</sup> | 3 時間                 | ● ●                                                   |
|                                                                                                                                                                    | キロサイドと同量の生食を抜いてから混注               |                     |                          |                      |                                                       |
| 5                                                                                                                                                                  | 主ルート                              | 生食500mL             | 1 本 / body               |                      | ● ● ●                                                 |
|                                                                                                                                                                    | 点滴静注                              | エトポシド注              | 100 mg / m <sup>2</sup>  | 2 時間                 | ● ● ●                                                 |
|                                                                                                                                                                    | 100mg当たり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する。 |                     |                          |                      |                                                       |
| 6                                                                                                                                                                  | 主ルート                              | 生食50mL              | 1 本 / body               | 5 分                  | ● ● ● ●                                               |
|                                                                                                                                                                    | 点滴静注                              |                     |                          |                      |                                                       |
| 7                                                                                                                                                                  | 経口投与                              | ボララミン錠2mg           | 1-3 錠 / body             |                      | ●                                                     |
|                                                                                                                                                                    |                                   | ジクロフェナクNa錠25mg      | 1 錠 / body               |                      | ●                                                     |
|                                                                                                                                                                    | リツキシマブ投与の30分前                     |                     |                          |                      |                                                       |

エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。  
 キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。  
 デキサート: デキサート33mgはデキサメタゾン40mgに相当する。  
 リツキシマブ: 前投薬としてボラミン(2)1~3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。  
 リツキシマブ: 初回はECGモニターをつける。  
 リツキシマブ: 投与速度は初回は25mL/h × 1h、100mL/h × 1h、残りは200mL/hとする。  
 リツキシマブ: 2回目以降はinfusion reaction が初回になれば100mL/h × 1h、残りは200mL/hとする。