

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年5月14日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田 周二
レジメン名	CMR		
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	低悪性度Bリンパ腫
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	6 コース
抗がん剤投与量・投与日	リツキシマブ375mg/m <sup>2</sup> day1、グラニセトロン1mg/body day2-4、ノパントロン12mg/m <sup>2</sup> day2、ロイスタチン5mg/m <sup>2</sup> day2-4		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	主ルート	生食500mL	0.675 本 / m <sup>2</sup>		●																														
	点滴静注	リツキシマブ注	375 mg / m <sup>2</sup>	下記	●																														
		10倍に希釈する。																																	
2	主ルート	グラニセトロン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body	10 分	●																														
	点滴静注																																		
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																														
	点滴静注	ノパントロン注	12 mg / m <sup>2</sup>	30 分	●																														
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分		●	●																												
	点滴静注																																		
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●																												
	点滴静注	ロイスタチン注	5 mg / m <sup>2</sup>	2 時間	●	●	●																												
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●	●																											
	点滴静注																																		
7	経口投与	ポララミン錠2mg	1-3 錠 / body		●																														
		ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body		●																														
		リツキシマブ投与の30分前																																	

【投与上の注意】  
 リツキシマブ: 前投薬としてポララミン(2mg)1~3錠、ジクロフェナクNa(25mg)1錠を内服する。  
 リツキシマブ: 初回はECGモニターをつける。  
 リツキシマブ: 投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。  
 リツキシマブ: 2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。