

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成21年10月14日	使用開始日	平成21年11月1日
登録診療科	血液内科	申請医師	西浦
レジメン名	ICD(ホスアプレピタント)		
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	21	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日	イリノテカン65mg/m ² day1.8、シスプラチン30mg/m ² day1.8、デキサメタゾン40mg/body day1-2.8-9	有効な限り	コース
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1	本 / body	●							●													
	点滴静注	ホスアプレピタント注150mg	1	本 / body	30分	●						●													
2	側管①	ハロセトン注ハッグ0.75mg	1	本 / body	●							●													
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5	本 / body	30分	●						●													
3	主ルート	生食100mL	1	本 / body	●								●												
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5	本 / body	30分	●							●												
4	側管①	生食500mL	1	本 / body	●							●													
	点滴静注	シスプラチン注	30	mg / m ²	2時間	●						●													
シスプラチンと同量の生食を抜いてから混注する																									
5	側管①	5%ブドウ糖液500mL	1	本 / body	●							●													
	点滴静注	イリノテカン注	65	mg / m ²	90分	●						●													
6	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5分	●						●													
	点滴静注																								

【投与上の注意】

- ・ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
 - ・ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
 - ・ホスアプレピタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- デキサート:デキサート33mgはデキサメタゾン40mgに相当する。
- シスプラチン:希釈は生食のみ。
- シスプラチン:腎毒性軽減のためhydrationが必要。
- hydrationのため、day1及びday8に補液を投与する。