レジメン登録フォーマット

レン / つ	フロ 外ノイ			- n																			
申請年月日		平成30年5月14日	使用開始日		_	//4 224 .4	:+ 	소ᅎᆖ		11 -	<u> </u>												
登録診療科レジメン名		血液内科 R-hyperCVAD	申請医師	上田 周		16字類	法委員	云承記	5年月	平	以 3	0 年	6)	∃									
			Г	1100007E kt 60	D/MID.		****		£														
疾患名 適応分類		非ホジキンリンパ腫	適応の備考	CD20陽性の	B細胞'	注非 不	ンキンリ	ンハ胆	里														
									/	L/L				. +-			- Arts						
1コース日数		21	日間総コース数	4	4		、コージ		<u>惟吐'</u>	性リスク	/ da	y1 <u>,1</u>	2:敮/	小皮、	day2-	<u>-5:4</u>	<u> 寺 </u>						
		投与日 リツキシマブ375mg/m				モソルロ	こシン5(mg/ m	i dayb	、オンコ	ヒン1.4	4mg∕I	m da	ıy5,12	、ナキ	トサメ	・タソン	∕40m	g/boo	dy da	ay2-t	–12,	·15
治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●) (day) 投 与順 ルート・方法 薬 剤 名																							
投与順	ルート・方法		投 与 量			4 5	6 7 8	9 1	0 11	12 13	14 15	5 16	17	18 19	20	21		<u> </u>	Щ.		ightharpoonup		
1	主ルート	生食500mL	0.675 本 / m	•				.11								ļļ							
	点滴静注	リツキシマブ注	375 mg / m	下記 ●												.					ıl		
			/													.					ıl		
	10倍に希																		ш				
2	側管	グラニセトロン注バック 1mg/50mL	1 本 / boo	у	• •	• •										.					ıl		
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / boo	y 60 分	• •	• •										.					ıl		
	W/16191.7T				<u> </u>			.11								<u> </u>				1	ıl		
																					ш		
3	主ルート	生食100mL	1 本 / boo					.11		• •	•					ļļ							
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / boo	y 60 分						• •	• •)				.					ıl		
	W/16191.7T				<u> </u>			.11								<u> </u>				1	ıl		
																					\sqcup		
4	側管	生食250mL	1 本 / boo 300 mg / m	у	• •	•										.					ıl		
	点滴静注	エンドキサン注	300 mg / m	2 時間	• •	•		.11								<u> </u>				1	ıl		
		閉鎖式システム使用	/													.					ıl		
	エンドキサ	ン300mg/mを12時間毎に投与す	<u>රං</u>																Ш.		\sqcup		
5	側管	生食250mL	1 本 / boo	У	• •	•		.11								 					ıl		
	点滴静注	エンドキサン注 閉鎖式システム使用	300 mg / m	2 時間	• •	•		.11								 					ıl		
		閉鎖式システム使用	1 : /													.					ıl		
	エンドキサ	ン300mg/㎡を12時間毎に投与す	<u>රං</u>																Щ		${igsplus}$		
6	主ルート	生食100mL ドキソルビシン注	1 本 / boo	У		•		.11								ļļ							
	点滴静注	ドキソルビシン注	50 mg / m	60 分				.11								ļļ							
		.,,	/					.11								ļļ							
		は500mg/ m まで。		1			\bot	$\perp \perp$		_								_	Щ	\perp	\mapsto	_	
7	主ルート	生食100mL	1 本 / boo			•				•						ļļ				4			
	点滴静注	オンコビン注	1.4 mg / m	60 分		•				•						ļļ				4			
								.11								ļļ							
8	<u> </u>	量は2mg/body/回を超えないことと			$\sqcup \sqcup$	44	++	$\perp \perp$	$\perp \perp$							Ш	$-\!\!\!\!\!+$	\dashv	—	$\downarrow \downarrow \downarrow$	\longrightarrow	\dashv	
	主ルート	生食50mL	1 本 / boo	y 5 分 ●	ļļļ	•		44		•			 .			 				4			
	点滴静注				ļļļ			44					 .			 				4	ıl		
			/		ļļļ			44								ļļ					ļļ.		
		10			\Box		$\bot \bot$	$\perp \perp$	$\perp \downarrow \downarrow$						1		\perp	\bot	Щ	Щ	\sqcup	ightharpoonup	
9		ポララミン錠2mg	1-3 錠 / boo	····				44								ļļ				4	ļļ.		
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / boo	y •	ļļļ			44								ļļ				4	ļļ.		
			/		ļļļ			44					 .			 				4			
	リツキシマ	ブ投与の30分前															L	\perp	\perp		ш	L	

【投与上の注意】

デキサート: デキサート33mgはデキサメタゾン40mgに相当する。 ドキソルビシン: 文献では16.6mg/㎡を3日間持続投与となっているが、当院では50mg/㎡を1日で投与する。

リツキシマブ:前投薬としてポララミン(2)1~3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。

リツキシマブ:初回はECGモニターをつける。

リツキシマブ: 投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。 リツキシマブ: 2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。