

申請年月日	平成30年5月14日	使用開始日					
登録診療科	血液内科	申請医師	上田 周二	化学療法委員会承認年月	平成	30 年	6 月
レジメン名	R-standard THP-COP						
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫				
適応分類	寛解導入療法、地固め療法						
1コース日数	21	日間	総コース数	6-8	コース	催吐性リスク	day1: 最小度、day2: 中等度
抗がん剤投与量・投与日 リツキシマブ375mg/m ² day1、エンドキサン500mg/m ² 、ピノルビン30mg/m ² 、オンコビン1mg/m ² 各day2、プレドニン錠30mg/m ² day2-6							

【投与上の注意】

- ・ブレドニン錠を服用するので、中等度催吐性に基づくデキサメタゾンの投与はしないこととする。
- ・リツキシマブ：前投薬としてポララミン(2)1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
- ・リツキシマブ：初回はECGモニターをつける。
- ・リツキシマブ：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
- ・リツキシマブ：2回目以降はinfusion reaction が初回になれば100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。