

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年5月14日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田 周二
レジメン名	R-VeMP		
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	8 コース
抗がん剤投与量・投与日		リツキシマブ375mg/m ² day1、ノバントロン6mg/m ² 、エトポシド100mg/m ² 各day2-4、プレドニン錠60mg/m ² day2-6	
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)			

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)			(day)																														
投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食500mL	0.675	本 / m ²		●																											
	点滴静注	リツキシマブ注	375	mg / m ²	下記	●																											
	10倍に希釈する。																																
2	主ルート	生食100mL	1	本 / body			●	●	●																								
	点滴静注	ノバントロン注	6	mg / m ²	30 分		●	●	●																								
3	主ルート	生食500mL	1	本 / body			●	●	●																								
	点滴静注	エトポシド注	100	mg / m ²	60 分		●	●	●																								
	100mgあたり250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和。																																
4	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●	●	●	●																								
	点滴静注			/																													
5		ボララミン錠2mg	1-3	錠 / body		●																											
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1	錠 / body		●																											
	リツキシマブ投与の30分前																																
6		プレドニン錠5mg	60	mg / m ²			●	●	●	●	●																						
	経口投与			/																													
	医師の指示通り内服																																

【投与上の注意】

・プレドニン錠を服用するので、軽度催吐性に基づくデキサメタゾンの投与はしない。
 エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。
 リツキシマブ: 前投薬としてボララミン(2)1~3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
 リツキシマブ: 初回はECGモニターをつける。
 リツキシマブ: 投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
 リツキシマブ: 2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。