レジメン登録フォーマット

	- ユッケノハ	` ' / '								_																									
申請年	月日	-			開始日																			_											
登録診	療科	血液内科		申請	医師					化	学療	法	委員	会才	系認 4	年月		2	P.成		年		月												
レジメ	ン名	CA(キロサイド持続静注)																																	
疾患名		骨髄異形性症候群			適応の備考		間隔																												
適応分類		寛街導入、地固め、維持・強化			か 浦 右																														
1コー		14	日間	総コ-	−ス数							=	コーフ	ζ		催吐	上性!	リス ?	ク	最:	少度														
抗がん	/剤投与量	投与日 キロサイド20mg/m day	1-14、	アクラシ	フノン14	mg/n	n [®] day	y1−4																											
治療ス	ケジュール							(day	_′)																										
投与順	ルート・方法	薬剤名	1	没 与	量	投与	時間	1 2	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	13	14																
1	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	30	分	•			ll			<u></u>	<u> </u>		l		I			J			1	1		T	\prod	T	J	T	T	Ι	
	点滴静注		T						Ī		ΙΠΤ				Ī		T	T					1		T	T			T	T	T	Ī		- T	
	点的肝/工	ルートキープ用	T						T	T	ΙΠΙ				Ī		T	T					1		T	T	1		T	T	1	Ī		-T	
									T	T	ΙΠΙ				Ī		T	T					1		T	T	1		T	T	1	Ī		-T	
2	主ルート	生食500mL	1	本	/ body			• (•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•				1		1				\Box	\prod	I	<u> </u>			
	精密持続	キロサイド注	20	mg	/ m³	24	時間	•		•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•						T	T			T		1	Ī		T	
	静注				/				Ι	I							I	I							I	I									
3	側管	生食100mL	1	本	/ body			•									I	1							1							<u> </u>			
	点滴静注	アクラシノン注	14	mg	/ m³	30	分	•									I	I							I	I									
					/				Ι	I							I	I							I	I									
	70歳以上	0歳以上では10mg/m/日に減量する																																	
4	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5	分		Ι		\prod		T						•																
	点滴静注		1			<u> </u>				1	11			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	1							1	1	1					<u>.l</u>			
	が小りまで工		1			<u> </u>					<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>	1	1	<u> </u>]
																																Ш.			

【投与上の注意】

G-CSFを併用しても良い。(CAG療法)

血小板減少などの出血傾向が認められる場合は、キロサイド皮下注を持続静注の「CA(キロサイド持続静注)」レジメンに変更する。(持続静注の場合は、20mg/m²/日 day1-14を標準とする)