レジメン登録フォーマット

	- <u>11</u> 25 7 7	• > 1																																	
申請年	月日	平成31年3月14日		使用閉	見始 日																														
登録診療科		内科		申請医師			楢原啓之						化学療法委員会承認年月									平成 31 年 4 月													
レジメ	ン名	Tri-weekly ドセタキセル+サイラム	ムザ(肺	癌)																															
疾患名 適応分類		非小細胞肺癌		適応の備考		# *																													
		進行•再発																																	
1コース日数		21		総コー		有効な限り コース 催吐性リスク 軽度																													
抗がん	/剤投与量	·投与日ドセタキセル60mg/㎡ da	ay1、サ	イラム	ザ10mg	/Kg c	day1																												
治療ス	ケジュール	╭・投与日程(投与日は●)					(day	y)																										
投与順	ルート・方法		1	役 与	量	投与	時間	1	2 3	3 4	5	6	7	8	9 1	0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	主ルート	生食50mL	1	本	/ body																														
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1	本	/ body	30	分	•	<u> </u>		1	1								ļ		1	1		1	1	Ť								
	从 市注				/						1											1	1		1	1	Ī							Ī	ļ
										<u> </u>	1														1	1	Ī							Ī	l
2	主ルート	生食250mL	1	本	/ body			•																											
	点滴静注	サイラムザ	10	mg	/ Kg	60	分			T		[l		T	1	Ţ	1	T	T		[[Ī	[
				1	/					T		[l		T	1	Ţ	1	T	T		[[Ī	Ī
	サイラムヤ	fと同量の生食を抜いてから混注す	する(合	計25C	mLとす	る)					Ţ	[l		T	1	1	1	I	Ī		[[Ī	Ī
3	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5	分						[[<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	I	<u> </u>	Ī	[<u> </u>		[
	点滴静注		1		/	<u> </u>		<u> </u>	Ш.		1	<u> </u>								<u> </u>	<u> </u>	<u>.l</u>	1	L	<u>.l</u>	1	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	İ	<u> </u>	<u> </u>	
	杰利那江		1	<u> </u>	/	<u> </u>		<u> </u>	Ш.		1	<u> </u>								<u> </u>	<u> </u>	<u>.l</u>	1	L	<u>.l</u>	1	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	İ	<u> </u>	<u> </u>	
			•			-																													
4	主ルート	生食250mL	1	本	/ body						1												J				<u> </u>	I		ĺ					
	点滴静注	ドセタキセル注	60	mg	/ m ²	60	分		Ш.		1	<u> </u>								<u> </u>	<u> </u>	<u>.l</u>	1	L	<u>.l</u>	1	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	İ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	杰/向肝/工			<u> </u>	/						1									<u> </u>			J				<u> </u>		İ	İ		İ	<u> </u>	<u> </u>	
										T		[l		T	1	Ţ	1	T	T		[[Ī	[
5	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5	分									[
	点滴静注				/						1												1	1	<u></u>		<u> </u>			<u> </u>					
	示心肝注			<u> </u>	/	l			Ι.											l				<u> </u>		1	<u> </u>		1	1]	L	
									Ī	Ī	Ţ	T								l	Ī	1	1	Ī	1	T	Ī		[[[Ī	I

【投与上の注意】

[・]day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。 サイラムザ:前投薬として投与の30分前に、レスタミン5錠の内服

サイラムザ: 投与時はインラインフィルター(O. 2またはO. 22 µm)を使用すること。 投与後には、ラインを生食でフラッシュする。