レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020/1/23	使用開始日			
登録診療科	腎臓内科	申請医師	米本佐代子	化学療法委員会承認年月	2020 年 2 月
レジメン名	リツキサン（難治性ネフローゼ症候群）				
疾患名	難治性ネフローゼ症候群	適応の備考	難治性ネフローゼ症候群（頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す）では、小児期に特発性ネフローゼ症候群を発症しステロイド感受性を示す患者で、既存治療（ステロイド、免疫抑制剤等）では寛解が維持できない患者に限ること		
適応分類					
1コース日数	7 日間	総コース数	4 コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	リツキサン375mg/㎡ day1 （最大投与量500mg ）				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●) （day）

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	主ルート	生食500mL	0.6750 本 / ㎡		●						
	点滴静注	リツキサン注	375 mg / ㎡	下記	●						
			/								
	10倍に希釈する										
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●						
	点滴静注		/								
			/								
3	経口投与	ポララミン錠2mg	1-3 錠 / body		●						
		ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body		●						
			/								
	リツキサン投与の30分前										

【投与上の注意】
リツキサン：前投薬としてポララミン（2）1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
リツキサン：初回はECGモニターをつける。
リツキサン：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
リツキサン：2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
リツキサン：1回あたりの最大投与量は500mgまでとする。