

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成23年2月10日	使用開始日	
登録診療科	泌尿器科	申請医師	
レジメン名	MVAC(カルボプラチン)		
疾患名	尿路上皮がん	適応の備考	シスプラチンが投与できない患者のみ使用
適応分類	進行・再発、術後補助、術前		
1コース日数	28	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日	メトレキセート30mg/m ² day1.15.22、エクザール3mg/m ² day2.15.22、ドキシルピシン30mg/m ² day2、カルボプラチン5AUC/body day2		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●															●												
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●															●												
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●															●												
	点滴静注	メトレキセート注	30 mg / m ²	30 分	●															●												
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30 分	●																											
4	主ルート	アロキシ注バッグ0.75mg/50mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●																											
		デキサート注1.65mg	2 本 / body			●																										
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	カルボプラチン注	5 AUC / body	60 分	●																											
6	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●															●												
	点滴静注	エクザール注	3 mg / m ²	30 分	●															●												
7	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	ドキシルピシン注	30 mg / m ²	30 分	●																											
8	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●														●												
	点滴静注																															
9	主ルート	生食100mL	1 本 / body																													
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分							●																					
10	主ルート	生食100mL	1 本 / body																													
	点滴静注	デキサート注6.6mg	2 本 / body	30 分							●	●																				

- 【投与上の注意】
- ・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
 - ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
 - ・プロイメントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
 - ・ドキシルピシンの総投与量は500mg/m²まで。