

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成22年5月13日	使用開始日	
登録診療科	泌尿器科	申請医師	
レジメン名	カルボプラチン併用放射線療法		
疾患名	尿路上皮がん	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	35 日間	総コース数	1 コース 催吐性リスク 中等度

抗がん剤投与量・投与日 ||カルボプラチン65mg/m<sup>2</sup> day1-5,29-33

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																				
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30分	●																																				
2	主ルート	グラニセトン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																																
	点滴静注	デキサート注1.65mg	3 本 / body	30分	●	●	●	●	●																																
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																																
	点滴静注	カルボプラチン注	65 mg / m <sup>2</sup>	30分	●	●	●	●	●																																
AUCではなく体表面積で計算する																																									
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●	●	●	●	●																																
	点滴静注																																								

【投与上の注意】

放射線治療開始日から、5週目に5日間連続投与。放射線はday1-35連日照射。

・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。

・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。

・プロイメントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。

カルボプラチン:AUCではなく体表面積で計算する。