

レジメン登録フォーマット

| | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------------------|
| 申請年月日 | | 使用開始日 | | |
| 登録診療科 | 泌尿器科 | 申請医師 | | 化学療法委員会承認年月 平成 年 月 |
| レジメン名 | ゲムシタビン(尿路上皮がん) | | | |
| 疾患名 | 尿路上皮がん | 適応の備考 | | |
| 適応分類 | | | | |
| 1コース日数 | 28 日間 | 総コース数 | コース | 催吐性リスク 軽度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 ゲムシタビン1000mg/m ² day1.8.15 | | | | |

治療スケジュール・投与日程 (投与日は●) (day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-----|--------|-------------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ゲムシタビン注 | 1000 mg / m ² | 30 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

・day1.8.15のデキサート注は、3.3mgでもよい。
 ゲムシタビン：100mLで希釈し、30分で投与。