

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成24年3月5日	使用開始日	
登録診療科	泌尿器科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	BPM		
疾患名	陰茎がん	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	28	日間 総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク day1.15.22:高度、day1.15.22:軽度
抗がん剤投与量・投与日	メトトレキサート200mg/m ² day1.15.22、シスプラチン20mg/m ² day2-6、プレオ10mg/m ² day2-6		
治療スケジュール・投与日程（投与日は●）	(day)		

投与順	ルート/方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	ソリューゲンF500mL	1 本 / body	2 時間	●														●													
	点滴静注	メイロン注7%20mL	1 本 / body	2 時間	●														●													
	9:00-11:00																															
2	主ルート	ソルデム3号500mL	1 本 / body	2 時間															●													
	点滴静注	メイロン注7%20mL	1 本 / body	2 時間															●													
	11:00-13:00																															
3	主ルート	ソリューゲンF500mL	1 本 / body	2 時間	●														●													
	点滴静注	メイロン注7%20mL	1 本 / body	2 時間	●														●													
	13:00-18:00																															
4	側管1	生食100mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	デキササード注6.6mg	1 本 / body	30 分															●													
	13:00-13:30																															
5	側管1	生食50mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	メトトレキサート注200mg	200 mg / m ²	5 分															●													
	13:30-13:35																															
6	主ルート	ソルデム3号500mL	1 本 / body	2 時間															●													
	点滴静注	メイロン注7%20mL	1 本 / body	2 時間															●													
	18:00-24:00																															
7	側管2	ロイコホリン注3mg/1mL	5 本 / body																●													
	静脈注射																		●													
	day1.15.22に、18:00から19:00まで15mgを投与開始し、6時間ごと3日間静注する																															
8	主ルート	ソルデム3号500mL	1 本 / body	2 時間															●													
	点滴静注																		●													
	9:00-11:00																															
9	主ルート	ソリューゲンF500mL	1 本 / body	2 時間	●														●													
	点滴静注				●														●													
	11:00-13:00																															
10	側管2	生食250mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	プロイゾンド注150mg	1 本 / body	30 分															●													
	12:00-12:30																															
11	側管2	アロキシン注ハック0.75mg	1 本 / body																●													
	点滴静注	デキササード注6.6mg デキササード注1.65mg	1 本 / body 2 本 / body	30 分															●													
	12:30-13:00																															
12	側管2	生食50mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	デキササード注6.6mg	1 本 / body	30 分															●													
	12:30-13:00																															
13	側管2	生食50mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	デキササード注6.6mg	2 本 / body	30 分															●													
	12:30-13:00																															
14	主ルート	生食500mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	シスプラチン注20mg	20 mg / m ²	2 時間															●													
	13:00-15:00 シスプラチンと同量の生食を抜いて混注する																															
15	主ルート	ソリューゲンF500mL	1 本 / body	2 時間															●													
	点滴静注																		●													
	15:00-17:00																															
16	主ルート	生食50mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	プレオ注10mg	10 mg / m ²	5 分															●													
	15:00-15:05																															
17	側管2	フロセド注20mg	1 本 / body																●													
	静脈注射																		●													
	15:00																															
18	主ルート	ソルデム3号500mL	1 本 / body	2 時間															●													
	点滴静注																		●													
	17:00-19:00																															
19	主ルート	ソリューゲンF500mL	1 本 / body	3 時間															●													
	点滴静注																		●													
	19:00-22:00																															
20	主ルート	生食50mL	1 本 / body																●													
	点滴静注	デキササード注6.6mg	1 本 / body	30 分															●													
	12:30-13:00																															

【投与上の注意】
 ・プロイゾンドは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
 ・プロイゾンドは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
 ・プロイゾンドの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキササード注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
 シスプラチン：希釈は生食のみ。
 シスプラチン：腎毒性軽減のためhydrationが必要。
 シスプラチン：適宜利尿剤を投与
 ロイコホリン：day1.15.22 18時から6時間毎にロイコホリン15mgを静注、3日間行う。(18時、24時、6時、12時)