

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	婦人科	申請医師	
レジメン名	BEP(卵巣がん)(アブレヒタントカプセル)		
疾患名	卵巣がん	適応の備考	適応は卵巣がん(胚細胞腫瘍)のみ
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース 催吐性リスク day1-5:高度、day9.16:最少度
抗がん剤投与量・投与日 シスプラチン20mg/m ² day1-5、プレオ20mg/m ² day2.9.16、エトポシド100mg/m ² day1-5			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)			
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量 投与時間 (day)
1	主ルート 点滴静注	ソリューゲンF500mL	2 本 / body 4 時間
2	側管① 点滴静注	アロキン注0.75mg デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 30 分 1 本 / body 2 本 / body
3	側管① 点滴静注	生食50mL デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 30 分 1 本 / body 2 本 / body
4	主ルート 点滴静注	生食500mL シスプラチン注	1 本 / body 2 時間 20 mg / m ²
5	主ルート 点滴静注	ソリューゲンF500mL	1 本 / body 2 時間
6	主ルート 点滴静注	生食100mL	1 本 / body 15 分
7	側管② 点滴静注	生食250mL プレオ注	1 本 / body 60 分 20 mg / m ²
8	側管② 点滴静注	生食500mL エトポシド注	1 本 / body 2 時間 100 mg / m ²
9	主ルート 点滴静注	ソリューゲンF500mL	1 本 / body 2 時間
10	主ルート 点滴静注	生食50mL	1 本 / body 5 分
11	経口投与	アブレヒタントカプセル	125 mg / body
12	経口投与	アブレヒタントカプセル	80 mg / body

【投与上の注意】

アブレヒタントカプセル: 各コースにおいて、投与期間は3日間を目安とする。成人で5日間・12歳以上の小児で3日間を超えて投与した際の有効性及び安全性は確立していない。
 アブレヒタントカプセル: 原則としてコルチコステロイド及び5-HT3受容体拮抗型制吐剤と併用して使用すること。
 アブレヒタントカプセル: 抗悪性腫瘍剤の投与1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与すること。
 エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。
 シスプラチン: 希釈は生食のみ。
 シスプラチン: 適宜利尿剤を投与