

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	婦人科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成 年 月
レジメン名	イリノテカン+ドセタキセル				
疾患名	子宮がん・卵巣がん				
適応分類		適応の備考			
1コース日数	21	日間	総コース数	コース	催吐性リスク 中等度

抗がん剤投与量・投与日 | イリノテカン60mg/m<sup>2</sup> day1.8、ドセタキセル30mg/m<sup>2</sup> day1.8

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●													
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30分	●							●													
2	主ルート	グラニセトロン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body		●							●													
	点滴静注	デキサート注1.65mg	3 本 / body	30分	●							●													
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●							●													
	点滴静注	イリノテカン注	60 mg / m <sup>2</sup>	90分	●							●													
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●													
	点滴静注	ドセタキセル注	30 mg / m <sup>2</sup>	60分	●							●													
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●							●													
	点滴静注																								

【投与上の注意】

- ・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・プロイメントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。