

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成22年1月18日	使用開始日	平成22年2月20日
登録診療科	婦人科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 22年 2月
レジメン名	ウィークリーDC		
疾患名	子宮がん・卵巣がん	適応の備考	
適応分類	術後補助化学療法		
1コース日数	28 日間	総コース数	6 コース 催吐性リスク day1:高度、day8,15:軽度
抗がん剤投与量・投与日	ドセタキセル25mg/m ² day1,8,15、カルボプラチン5AUC/body day1		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	プロイメンド注150mg	1 本 / body	30分	●																											
2	主ルート	アロキン注バッグ0.75mg	1 本 / body		●																											
	点滴静注	デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 2 本 / body	30分	●																											
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body									●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30分								●																				
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●								●																			
	点滴静注	ドセタキセル注	25 mg / m ²	60分	●								●																			
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	カルボプラチン注	5 AUC / body	60分	●																											
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●								●																			
	点滴静注			5分	●								●																			
7	経口投与	デカドロン錠 分2 朝食後	8 mg / body																													
8	経口投与	デカドロン錠 分2 朝食後	16 mg / body																													

【投与上の注意】

- ・プロイメンドは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメンドは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・プロイメンドの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。