レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	婦人科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　年　月
レジメン名	EMA-CO				
疾患名	絨毛性疾患	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	14　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	コスメゲン0.5mg/body　day1-2、エトポシド100mg/㎡　day1-2、メソトレキサート300mg/㎡　day1、オンコビン1mg/㎡　day8、エンドキサン600mg/㎡　day8				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●													
	点滴静注	プロイメンド注150mg	1 本 / body	30 分	●													
			/															
2	主ルート	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1 本 / body		●	●												
	点滴静注	デキサート注1.65mg	3 本 / body	30 分	●	●												
			/															
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●	●												
	点滴静注	コスメゲン注	0.5 mg / body	30 分	●	●												
		注射用水20mL	1 本 / body															
	1V(0.5mg)あたり1.1mLの注射用水で溶解する																	
4	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●												
	点滴静注	エトポシド注	100 mg / ㎡	60 分	●	●												
			/															
	100mgあたり250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する																	
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●													
	点滴静注	メソトレキセート注	300 mg / ㎡	12 時間	●													
			/															
6	主ルート	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1 本 / body									●						
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分								●						
		デキサート注1.65mg	2 本 / body									●						
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body									●						
	点滴静注	オンコビン注	1 mg / ㎡	5 分								●						
			/															
8	主ルート	生食250mL	1 本 / body									●						
	点滴静注	エンドキサン注	600 mg / ㎡	60 分								●						
			/															
9	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●						●						
	点滴静注		/															
			/															
10		ロイコボリン錠5mg	6 錠 / body			●	●											
	経口投与		/															
			/															
	分2朝夕食後																	
11		デカドロン錠	8 mg / body										●	●	●			
	経口投与		/															
			/															
	分2朝昼食後																	

【投与上の注意】
・ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
・ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
・ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
・day8のデキサート注は、6.6mgでもよい。
・day11のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる。
・デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday9～11の代わりに5HT3受容体拮抗薬day9～11を追加する。
エトポシド：DEHPフリー点滴セット使用。
day2,day3にロイコボリン錠（5mg）６錠分２（朝、夕）/日を投与すること