

レジメン登録フォーマット

申請年月日			使用開始日		
登録診療科	婦人科		申請医師		
レジメン名	MA療法				
疾患名	絨毛性疾患		適応の備考	総コース数は、hCG値cutoff後、追加2～3コース 治療に抵抗性の場合は、他の療法に変更 副作用等が予測される場合は、減量あるいは投与日数を5日連続から4日連続に変更する。	
適応分類					
1コース日数	14	日間	総コース数	コース	催吐性リスク 中等度
抗がん剤投与量・投与日 コスメゲン0.01mg/kg day1-5、メソトレキセート20mg/body day1-5					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)
1	主ルート	グラニセトロン注1mg/50mL	1 本 / body		● ● ● ● ●
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	● ● ● ● ●
		デキサート注1.65mg	2 本 / body		● ● ● ● ●
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		● ● ● ● ●
	点滴静注	メソトレキセート注	20 mg / body	30 分	● ● ● ● ●
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		● ● ● ● ●
	点滴静注	コスメゲン注	0.01 mg / kg	30 分	● ● ● ● ●
		注射用水20mL	1 本 / body		● ● ● ● ●
			iV(0.5mg)あたり1.1mLの注射用水で溶解する		
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	● ● ● ● ●
	点滴静注		/		
5		デカドロン錠	8 mg / body		● ● ●
	経口投与		/		

【投与上の注意】

- ・day1-5のデキサート注は、6.6mgでもよい。
- ・day8のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる。
- ・デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday6-8の代わりに5HT3受容体拮抗薬day6-8を追加する。