レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	婦人科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	イホマイド単剤				
疾患名	肉腫	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	イホマイド1500mg/㎡　day1-5				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート 点滴静注	ソリューゲンF500mL メイロン7%20mL	1 本 / body 1 本 / body /	2 時間	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
2	側管 点滴静注	生食250mL プロイメンド注150mg	1 本 / body 1 本 / body /	30 分	● ●																				
3	側管 点滴静注	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL デキサート注1.65mg	1 本 / body 3 本 / body /	30 分	● ●																				
4	側管 点滴静注	グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 1 本 / body 2 本 / body	30 分		● ●	● ●	● ●	● ●																
5	主ルート 点滴静注	生食500mL イホマイド注	1 本 / body 1500 mg / ㎡ /	2 時間	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
	RT照射後は1200mg/㎡に減量する																								
6	側管 点滴静注	生食100mL ウロミテキサン注	1 本 / body 300 mg / ㎡ /	30 分	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
	イホマイド投与開始時に同時に投与する																								
7	主ルート 点滴静注	ソリューゲンF500mL	1 本 / body / /	2 時間	●	●	●	●	●	●	●														
8	主ルート 点滴静注	ソリューゲンG500mL メイロン7%20mL	1 本 / body 1 本 / body /	3 時間	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
9	側管 点滴静注	生食100mL ウロミテキサン注	1 本 / body 300 mg / ㎡ /	30 分	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
	イホマイド投与開始後4時間後に投与する																								
10	主ルート 点滴静注	ソリューゲンF500mL	1 本 / body / /	3 時間	●	●	●	●	●	●	●														
11	側管 点滴静注	生食100mL ウロミテキサン注	1 本 / body 300 mg / ㎡ /	30 分	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●																
	イホマイド投与開始後8時間後に投与する																								
12	主ルート 点滴静注	ソルデム3号500mL	1 本 / body / /	2 時間	●	●	●	●	●	●	●														

【投与上の注意】
・ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
・ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
・ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
・day2-5のデキサート注は、6.6mgでもよい。
点滴後、2～3日間は、1500mL/日の輸液を負荷する。