レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	ベバシズマブ+mFOLFOX6				
疾患名	大腸がん	適応の備考	CVポート		
適応分類	進行再発				
1コース日数	14　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	ベバシズマブ5mg/Kg　day1、オキサリプラチン85mg/㎡day1、5－FU400mg/㎡day1、5－FU2400mg/㎡day1(46時間持続)				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食20mL	1 本 / body		●													
	中心静脈注射																	
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	中心静脈注射		/															
	プライミング用																	
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●													
	中心静脈注射	ベバシズマブ	5 mg / kg	90 分	●													
			/															
	投与速度は1回目90分、忍容性が確認されれば、2回目60分、3回目以降30分で投与可。																	
4	主ルート	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●													
	中心静脈注射	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●													
		ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液1.65mg/0.5mL	2 本 / body		●													
			/															
5	主ルート	5%ブドウ糖液250mL	1 本 / body	2 時間	●													
	中心静脈注射	オキサリプラチン	85 mg / ㎡		●													
			/															
	Rp5とRp6を同時に投与開始する。																	
6	側管	5%ブドウ糖液250mL	1 本 / body	2 時間	●													
	中心静脈注射	レボホリナート	200 mg / ㎡		●													
	Rp5とRp6を同時に投与開始する。																	
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	中心静脈注射	5-FU	400 mg / ㎡		●													
		点滴速度：5分																
8	主ルート	生食100mL	1 本 / body	46 時間	●													
	中心静脈注射	5-FU	2400 mg / ㎡		●													
		携帯型ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ																
	希釈後の液量を総量140mLとなるよう調製																	
			/															
	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●	●	●										
			/															
		分2　朝昼食後																

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

穿刺時に逆血を確認し、ポートの通過を確認すること

Rp5とRp6を同時に投与開始する。

day4のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる

day1のデキサート注は、6.6mgでもよい

デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday2～4の代わりに5HT3拮抗薬day2～4を追加する

オキサリプラチン：希釈は5%ブドウ糖液のみ。

ベバシズマブ：希釈は生食のみ。

ベバシズマブ：投与速度は1回目90分、忍容性が確認されれば、2回目60分、3回目以降30分で投与可。