

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年1月1日
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	化学療法委員会承認年 平成 年 月
レジメン名	イリノテカン(A法)(大腸がん)		
疾患名	大腸がん	適応の備考	
適応分類	進行再発		
1コース日数	28 日間	総コース数	コース催吐性リスク中等度
抗がん剤投与量・投与日 イリノテカン100mg/m ² day1,8,15			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body	30 分	●							●								●												
	点滴静注	ホスアプレビタント注150mg	1 本 / body		●							●								●												
2	主ルート	パロセトン注バッグ0.75mg50mL	1 本 / body	30 分	●							●								●												
	点滴静注	デキサート注射液1.65mg/0.5mL	3 本 / body		●							●								●												
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body	90 分	●							●								●												
	点滴静注	イリノテカン	100 mg / m ²		●							●								●												
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●								●												
	点滴静注																															

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

- Rp2の後に抗がん剤投与すること
- ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ホスアプレビタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- day1,8,15 デキサート注は、3.3mgでも可