

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年3月6日		使用開始日		
登録診療科	消化器内科・外科		申請医師	檜原啓之	化学療法委員会承認年月
レジメン名	オブジーボ(2週毎)(結腸・直腸がん)				
疾患名	大腸がん		適応の備考	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸がん	
適応分類	進行・再発				
1コース日数	14	日間	総コース数	有効な限り	コース
			催吐性リスク	最小度	
抗がん剤投与量・投与日 オブジーボ 240mg/body day1					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	オブジーボ	240 mg / body	30 分	●
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		

【投与上の注意】

オブジーボ:0.22または0.22μmのインラインフィルターを使用して投与する。

オブジーボ:希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。

オブジーボ:希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。