レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年1月1日		
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師		化学療法委員会承認	平成　　年　　月
レジメン名	ベクティビックス				
疾患名	大腸がん	適応の備考			
適応分類	進行再発				
1コース日数	14　日間	総コース数	コース	催吐性リス	最小度
抗がん剤投与量・投与日	ベクティビックス6mg/Kg day1				

治療スケジュール ・ 投与日程（投与日は●）　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食100mL	1 本 / body															
	点滴静注	ベクティビックス	6 mg / kg	60 分	●													
			/															
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	点滴静注																	
			/															
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。（例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。）

【投与上の注意】

ベクティビックス：投与時はインラインフィルター（0.2または0.22μm）を使用すること。

ベクティビックス：希釈は生食のみ。総液量を100mLに調製。最終濃度として10mg/mLを超えない。

（1回投与量が1000mgを超える場合には、全量が約150mLになるよう調製）

ベクティビックス：投与前後に、ラインを生食でフラッシュすること。

ベクティビックス：投与には、60分以上かけること。（1回投与量が1000mgを超える場合は90分以上かけること）

ベクティビックス：希釈後6時間以内に使用する。