

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/11/26	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	飯尾 禎元
レジメン名	TACE アイエーコール(肝細胞癌)(アブレピタントカプセル)		
疾患名	肝細胞がん	適応の備考	輸液、抗生剤等はパスオーダー
適応分類	進行再発		
1コース日数	28 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日	アイエーコール100mg/V(投与量調節) day1(動脈注射)		

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		(day)																														
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	点滴静注	アロキン注ハック0.75mg50mL	1 本 / body	30分	●																											
		デキサート注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●																											
		デキサート注射液1.65mg/0.5mL	2 本 / body		●																											
2	精密持続	生食100mL	0.7 本 / body	動注	●																											
	動脈注射	アイエーコール	100 mg / V		●																											
		投与時量調節																														
3	経口投与	アブレピタントカプセル	125 mg / body		●																											
		アイエーコールの投与1時間~1時間30分前に服用																														
4	経口投与	アブレピタントカプセル	80 mg / body			●	●																									
		分1午前中に服用																														
5	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●	●	●	●																							
		分2朝食後																														

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

アイエーコール: 投与前に1~2Lの輸液を4時間以上かけて投与する。

アイエーコール: 投与時から投与終了後1.5~3Lの輸液を6時間以上かけて投与する

アイエーコール: 投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトールやフロセミド等の利尿剤を投与すること

アイエーコール: 100mgあたり、湯浴(約50℃)で加温した70mLの生食を加え強く振り混ぜて溶解する