

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/11/26	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	飯尾 禎元
レジメン名	TACE アイエーコール(肝細胞癌)(ホスアプレビタント)		
疾患名	肝細胞がん	適応の備考	輸液、抗生剤等はパスオーダ
適応分類	進行再発		
1コース日数	28	日間 総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日アイエーコール100mg/V(投与量調節) day1(動脈注射)			

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body	30分	●																												
	点滴静注	ホスアプレビタント注150mg	1 本 / body		●																												
	抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴		/																														
2	主ルート	ハロセトン注バッグ0.75mg50mL	1 本 / body	30分	●																												
	点滴静注	テキサト注射液6.6mg/2ml テキサト注射液1.65mg/0.5mL	1 本 / body 2 本 / body		● ●																												
3	精密持続 動脈注射	生食100mL アイエーコール	0.7 本 / body 100 mg / V	動注	● ●																												
	投与时量調節		/																														
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body			●																											
	点滴静注	テキサト注射液6.6mg/2ml	1 本 / body	30分		●																											
5	主ルート	生食100mL	1 本 / body				●	●																									
	点滴静注	テキサト注射液6.6mg/2ml	2 本 / body	30分			●	●																									

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

アイエーコール:投与前に1~2Lの輸液を4時間以上かけて投与する。

アイエーコール:投与時から投与終了後1.5~3Lの輸液を6時間以上かけて投与する

アイエーコール:投与中は尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトールやフロセミド等の利尿剤を投与すること

アイエーコール:100mgあたり、湯浴(約50°C)で加温した70mLの生食を加え強く振り混ぜて溶解する