

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成31年1月28日	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	岡田 一幸
レジメン名	SOX(胃がん)		
疾患名	胃がん	適応の備考	
適応分類	進行再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 中等度
抗がん剤投与量・投与日	オキサリプラチン100mg/m ² day1、S-1 80mg~120mg/body 分2朝夕食後 day1夕食後-day15朝食後		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	クラシロン注ハック 1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●																				
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●																				
		デキサート注射液1.65mg/0.5mL	2 本 / body			●																			
2	主ルート	5%ブドウ糖液250mL	1 本 / body	2 時間	●																				
	点滴静注	オキサリプラチン	100 mg / m ²		●																				
3	主ルート																								
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
4	経口投与	S-1 分2 朝夕食後	9999 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	(体表面積)	1.25m ² 未満	80mg/day																						
		1.25~1.5m ² 未満	100mg/day																						
		1.5m ² 以上	120mg/day																						
	day1夕食後からday15朝食後まで服用する																								
5	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●	●	●																	
		分2 朝昼食後																							

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

- day4のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる
- day1のデキサート注は、6.6mgでもよい
- デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday2~4の代わりに5HT3拮抗薬day2~4を追加する
- オキサリプラチン:希釈は5%ブドウ糖液のみ。
- S-1は、休薬あるいは飲み忘れの場合でも(day1夕食後からday15朝食後)までの服用とする(ずらして服用しない)