

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成 年 月
レジメン名	幹細胞採取(EX大量)				
疾患名	多発性骨髄腫・悪性リンパ腫	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	21 日間	総コース数	1	コース	催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日 エンドキサン 2000mg/m ² day1,2					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30 分	●
2	主ルート	アロキシン注バック0.75mg	1 本 / body		●
	点滴静注	デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 2 本 / body	30 分	●
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	1 本 / body	30 分	●
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	2 本 / body	30 分	●
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●
	点滴静注	エンドキサン注	2000 mg / m ²	3 時間	●
6	閉鎖式システム使用				
	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注				

【投与上の注意】

- ・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・プロイメントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- ・エンドキサン投与量に合わせたウロミテキサン投与を添付文書通りに行う。