レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 乳腺外科 | 申請医師 | | 化学療法委員会承認年月 | 平成　　年　　月 |
| **レジメン名** | FEC(100)(ホスアプレピタント) | | | | |
| 疾患名 | 乳がん | 適応の備考 | 閉鎖式システム使用 | | |
| 適応分類 | | | | | |
| 1コース日数 | 21　日間 | 総コース数 | 4－6　コース | 催吐性リスク | 高度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | エピルビシン100mg/㎡　day1、エンドキサン500mg/㎡　day1、5-FU500mg/㎡　day1 | | | | |

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　(day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | 生食20mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | ホスアプレピタント注150mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | デキサート注6.6mg | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | デキサート注1.65mg | 2 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | 5-FU注 | 500 mg / ㎡ | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | エピルビシン注 | 100 mg / ㎡ | 15 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | エンドキサン注 | 500 mg / ㎡ | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | 閉鎖式システム使用 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 中心静脈 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口投与 | デカドロン錠 | 8 mg / body | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分2　朝昼食後 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口投与 | デカドロン錠 | 16 mg / body | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分2　朝昼食後 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。

・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。

・ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。