

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	ALL202-0 地固め第1コース(C1)(60歳未満)		
疾患名	急性リンパ性白血病		
適応分類	地固め療法	適応の備考	
1コース日数	14 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 中等度
抗がん剤投与量・投与日	キロサイド2000mg/m <sup>2</sup> × 2 day1-3、エトポシド100mg/m <sup>2</sup> day1-3、デキサメタゾン40mg/body day1-3、【随注】メトレキセート15mg/body、デキサメタゾン4mg/body day1		

治療スケジュール・投与日程 (投与日は●)		(day)																
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	グラニセトン注ハック 1mg/50mL	1 本 / body	15 分	●	●	●											
	点滴静注		/															
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●	●	●											
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / body	60 分	●	●	●											
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●											
	点滴静注	キロサイド注	2000 mg / m <sup>2</sup>	3 時間	●	●	●											
		60歳以上では原則1000mg/m <sup>2</sup> 12時間毎へ減量																
4	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●											
	点滴静注	エトポシド注	100 mg / m <sup>2</sup>	60 分	●	●	●											
		100mgあたり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する																
5	主ルート	グラニセトン注ハック 1mg/50mL	1 本 / body	15 分	●	●	●											
	点滴静注		/															
6	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●											
	点滴静注	キロサイド注	2000 mg / m <sup>2</sup>	3 時間	●	●	●											
		60歳以上では原則1000mg/m <sup>2</sup> 12時間毎へ減量																
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●											
	点滴静注		/															
8	なし	生食20mL	1 本 / body		●													
	随注	メトレキセート注	15 mg / body		●													
		デキサート注1.65mg	2 本 / body		●													

【投与上の注意】

キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。