

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年10月24日		使用開始日		
登録診療科	乳腺外科		申請医師	小西医師	
レジメン名	パージェタ+トラスツズマブ【2コース目以降】(併用ケモ中止時)初発				
疾患名	乳がん(HER2陽性)		適応の備考	HER2陽性の術前術後補助化学療法 パージェタ、トラスツズマブおよび化学療法併用で化学療法が中止された場合に使用	
適応分類	術前術後補助化学療法				
1コース日数	21	日間	総コース数	併用ケモ開始から術前術後合計1年	コース
抗がん剤投与量・投与日	パージェタ注420mg、トラスツズマブ注6mg/kg day1				
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)				
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
	プライミング用		/		
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●
	点滴静注	パージェタ注	420 mg / body	30 分	●
	投与時間(初回投与)60分、(2回目以降)30分可		/		
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●
	点滴静注	トラスツズマブ	6 mg / kg	30 分	●
	注射用水100mL	1 本 / body		●	
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可					
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
			/		
5			/		
			/		
			/		
6			/		
			/		
			/		

【投与上の注意】

パージェタ: 初回投与時間は60分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

パージェタトラスツズマブ併用: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満の時はパージェタ420mg/bodyトラスツズマブ6mg/kgを投与する。6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。

トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。