

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年11月2日		使用開始日																																								
登録診療科	乳腺外科		申請医師	小西医師																																							
			化学療法委員会承認年月	平成 30年 11月																																							
レジメン名	パージェタ+トラスツズマブ+weekly/パクリタキセル【初回】初発																																										
疾患名	乳がん		適応の備考																																								
適応分類	術前術後補助化学療法		HER2陽性乳がん 術後補助化学療法、術前化学療法																																								
1コース日数	21	日間	総コース数	術前術後合計1年																																							
			コース	催吐性リスク																																							
				軽度																																							
抗がん剤投与量・投与日 パージェタ840mg/body day1、トラスツズマブ8mg/kg day1、パクリタキセル80mg/m ² day1.8.15																																											
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)																																											
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																		
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																																						
	点滴静注		/																																								
プライミング用																																											
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																						
	点滴静注	パージェタ注	840 mg / body	60 分	●																																						
投与時間(初回投与)60分、(2回目以降)30分可																																											
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																						
	点滴静注	トラスツズマブ 注射用水100mL	8 mg / kg 1 本 / body	90 分	● ●																																						
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																											
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																																						
	点滴静注	デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg	1 本 / body 1 本 / body	30 分	● ●																																						
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																						
	点滴静注	パクリタキセル注	80 mg / m ²	60 分	● ●																																						
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																																						
	点滴静注		/																																								
7		レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●																																						
	経口投与		/																																								
パクリタキセル投与の30分前																																											

【投与上の注意】

・day1.8.15のデキサート注は、3.3mgでもよい。
 トラスツズマブ：初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。
 トラスツズマブ：初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。
 パージェタ：初回投与時間は60分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。
 パージェタトラスツズマブ併用：次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満の時はパージェタ420mg/bodyトラスツズマブ6mg/kgを投与する。6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。

パクリタキセル：前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
 パクリタキセル：DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。
 パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。