

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	トラスツズマブ【初回】+パクリタキセル		
疾患名	乳がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	コース 催吐性リスク day1.8.15:軽度、day22:最小度

抗がん剤投与量・投与日 ||トラスツズマブ4mg/kg day1、トラスツズマブ2mg/kg day8.15.22、パクリタキセル80mg/m² day1.8.15

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●													
	点滴静注		/	/																												
ブライミング用																																
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	トラスツズマブ	4 mg / kg	90 分	●																											
	点滴静注	注射用水100mL	1 本 / body		●																											
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body									●							●							●						
	点滴静注	トラスツズマブ	2 mg / kg	30 分								●							●							●						
	点滴静注	注射用水100mL	1 本 / body									●							●							●						
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																																
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●							●													
	点滴静注	デキサート6.6mg	1 本 / body	30 分	●							●							●													
	点滴静注	ファモチジン20mg	1 本 / body		●							●							●													
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●							●													
	点滴静注	パクリタキセル	80 mg / m ²	60 分	●							●							●													
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●													
	点滴静注		/	/																												
7	経口投与	レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●							●							●													
	パクリタキセル投与の30分前																															

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する

トラスツズマブの初回投与量は4mg/kg。2回目以降は2mg/kg。

トラスツズマブの投与時間は、初回投与90分、2回目以降は30分可

トラスツズマブ: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から1週間以内の時は、2mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて4mg/kgを投与し、次回以降は2mg/kgを1週間間隔で投与。

パクリタキセル: 前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。

パクリタキセル: DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。

パクリタキセル: アルコール不耐症がないことを確認する。