

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	
レジメン名	トラスツズマブ3週1回【2回目以降】+アブラキサン3週1回		
疾患名	乳がん	適応の備考	3週間に1回投与のレジメンだが、アブラキサンの初回投与後2週間目に血液検査が必要。
適応分類			
1コース日数	21	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日		トラスツズマブ6mg/kg day1、アブラキサン260mg / m ² day1	
治療スケジュール・投与日程（投与日は●）			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
ブライミング用																									
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	トラスツズマブ 注射用水100mL	6 mg / kg 1 本 / body	30 分	●																				
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																									
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●																				
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
5	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	アブラキサン注	260 mg / m ²	30 分	●																				
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						

【投与上の注意】

・day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。
 アブラキサン：1Vあたり生食20mLで溶解する。調製した懸濁液は必要量をバイアルから抜き取り、事前に空にした点滴バッグの中に入れる。（懸濁液を生食で希釈しない。）
 アブラキサン：インラインフィルターは使用しないこと。血液製剤の同意書と伝票が必要。
 アブラキサン：アブラキサンの前後は生食50mLでフラッシュする。
 アブラキサン：他剤との配合、または同じ静注ラインで同時注入しない。
 このレジメンは、トラスツズマブ2回目以降の投与患者に使用する
 トラスツズマブ：初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。
 トラスツズマブ：初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。
 トラスツズマブ：次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。