## レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日								
登録診療科	血液内科	申請医師	化学療法委員会承認年月							
	ALL202-U 維持療法1·3									
疾患名	急性リンパ性白血病                               急性リンパ性白血病									
適応分類	維持·強化療法	週心の偏考	維持療法1から4まで4サイクル、計16コース行う。 各コース終了から次コース開始の間隔は、原則として2週間とする。 頭蓋照射を行わない症例では、髄注は1サイクル目から3サイクル目までとする(4サイクル目は髄注を施行しない)。							
1コース日数	42 E	間  総コース数	コース 催吐性リスク 軽度							
抗がん剤投与量	・投与日 メントレキセート150mg/m	day1.15.29、ロイケ	-リン散50mg/m <sup>2</sup> day1-28、							

「抗かん剤投与量・投与日」「髄注】メソトレキセート12mg/body、キロサイド30mg/body、ソルコーテフ25mg/body day29
治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

治療ス	<u>.ケジュール</u>	〃・投 与 日 程(投 与 日 は ●	)				(da	ay)																										
投与順	ルート・方法	薬 剤 名	招	3 与	量	投与時間	1 1	2	3 4	1 5	6	7	8	9 1	10 1	1 1	2 13	3 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	~42
1	主ルート点滴静注	グラニセトロン注バック 1mg/50mL	1	本	/ body	30 分	•												•														•	
2	主ルート点滴静注	生食250mL メソトレキセート注	1 150	本 mg	/ body / m² /	30 分	•												•	,													•	
3	主ルート	生食50mL	1	本	/ body /	5 分	•																										•	
4	なし 髄注	生食20mL メソトレキセート注 キロサイド注 ソルコーテフ注100mg	1 12 30 0.25	本 mg mg 本	/ body / body / body / body																												•	
5	経口投与	ロイケリン散 白血球数により減量基準があ	50 る	mg	/ m <sup>2</sup> /		•	• (	•		•	•	•	• (	• •			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

【投与上の注意】