

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成28年11月	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美	化学療法委員会承認年月	平成28年11月 改訂:2020年2月
レジメン名	E-Ld(1-2コース目)【計2回】				
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考			
適応分類	進行・再発				
1コース日数	28	日間	総コース数	2	コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日	エムブリシテリ10mg/kg day1,8,15,22、レブラミド25mg/body day1-day21、レナデックス28mg/body day1,8,15,22				

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		(day)																															
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	15 分	●							●								●							●						
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body		●							●								●							●						
	点滴静注	ファモチジン注20mg	1 本 / body		●							●								●							●						
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●								●							●						
	点滴静注	/	/																														
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●								●							●						
	点滴静注	エムブリシテリ注	10 mg / kg	下記	●							●								●						●							
	点滴静注	注射用水100mL	1 本 / body		●							●								●							●						
1Vあたり300mg製剤は13mL、400mg製剤は17mLの注射用水で溶解 ◆希釈液量体重規定あり◆・体重50kg未満:生食150mL(抜き取り100mL) 50kg~90kg:生食250mL、90kg越:生食350mLで希釈する																																	
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●								●							●						
	点滴静注	/	/																														
	経口投与	レブラミドカプセル5mg 1日1回	25 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回	28 mg / body		●							●								●							●						
	経口投与	ポララミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body		●							●								●							●						
	経口投与	エムブリシテリ注投与の30分前までに内服			●							●								●							●						

【投与上の注意】

エムブリシテリ: 前投薬としてポララミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を30分前までに内服する。
 エムブリシテリ: 1コース目の投与速度は、初回は30mL/h×0.5h、60mL/h×0.5h、残りは120mL/hとする。2回目は180mL/h×0.5h、残りは240mL/hとする。3~4回目は300mL/hとする。
 エムブリシテリ: 2コース目以降の投与速度は、300mL/hとする。
 エムブリシテリ: 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。