

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/12/5	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	E-Pd(1-2コース目)【計2回】		
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	28	日間	総コース数
		2	コース
			催吐性リスク
			最小度
抗がん剤投与量・投与日 エムプリシティ10mg/kg day1,8,15,22、ボマリスト4mg/body day1-day21、レナデックス28mg又は8mg/body day1,8,15,22			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	15 分	●							●							●							●						
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body		●							●							●							●						
	点滴静注	ファモチジン注20mg	1 本 / body		●							●							●							●						
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●							●						
	点滴静注		/																													
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●							●							●						
	点滴静注	エムプリシティ注	10 mg / kg	下記	●							●							●						●							
	点滴静注	注射用水100mL	1 本 / body		●							●							●						●							
1Vあたり300mg製剤は13mL、400mg製剤は17mLの注射用水で溶解 ◆希釈液量体重規定あり◆: 体重50kg未満: 生食150mL(抜き取り100mL) 50kg~90kg: 生食250mL、90kg超: 生食350mL で希釈する																																
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●							●						
	点滴静注		/																													
	経口投与	ボマリストカプセル4mg 1日1回	4 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回	28 or 8 mg / body		●							●							●							●						
	経口投与	ボララミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body		●							●							●							●						
エムプリシティ注投与の30分前までに内服																																

【投与上の注意】

エムプリシティ: 前投薬としてボララミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を30分前までに内服する。
 エムプリシティ: 1コース目の投与速度は、初回は30mL/h×0.5h、60mL/h×0.5h、残りは120mL/hとする。2回目は180mL/h×0.5h、残りは240mL/hとする。3~4回目は300mL/hとする。
 エムプリシティ: 2コース目の投与速度は、300mL/hとする。
 エムプリシティ: 0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。