

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成27年2月6日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	ALL202-0 寛解導入療法(60才以上)		
疾患名	急性リンパ性白血病		
適応分類	寛解導入療法	適応の備考	
1コース日数	28	日間	総コース数
		コース	催吐性リスク
day1-3: 中等度、それ以外は最小度			
抗がん剤投与量・投与日	エンドキサン800mg/m <sup>2</sup> day1、ダウノマイシン30mg/m <sup>2</sup> day1-3、オンコピン1.3mg/m <sup>2</sup> day1.8.15.22、ロイナーゼ3000単位/m <sup>2</sup> day9.11.13.16.18.20、プレドニン錠60mg/m <sup>2</sup> day1-7		

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●																									
	点滴静注		/																													
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分								●	●		●				●	●		●		●		●						
	点滴静注	ルートキープ用	/																													
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	エンドキサン注 閉鎖式システム使用	800 mg / m <sup>2</sup>	3 時間	●																											
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●	●	●																									
	点滴静注	ダウノマイシン注	30 mg / m <sup>2</sup>	60 分	●	●	●																									
5	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●							●								●							●					
	点滴静注	オンコピン注	1.3 mg / m <sup>2</sup>	30 分	●							●							●							●						
最大投与量は2mg/body/回																																
6	主ルート	生食500mL	1 本 / body									●		●		●			●		●		●		●							
	点滴静注	ロイナーゼ注 注射用水100mL	3000 単位 / m <sup>2</sup> 1 本 / body	2 時間								●		●		●			●		●		●		●							
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●					●	●		●				●	●		●		●		●						
	点滴静注		/																													
8		プレドニン錠5mg	60 mg / m <sup>2</sup>		●	●	●	●	●	●	●																					
	経口投与		/																													
医師の指示通り																																

【投与上の注意】

ロイナーゼ: 生食で直接溶解すると白濁するおそれがあるので注射用水で溶解する。