レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成 21 年 12 月
レジメン名	ALL202-U Induction Therapy				
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考	15歳以上25歳未満の患者を対象とする 閉鎖式		
適応分類	寛解導入療法				
1コース日数	35 日間	総コース数	1 コース	催吐性リスク	day8.9.10：中等度、それ以外は最小度

抗がん剤投与量・投与日	プレドニン錠60mg/㎡ day1-7、デキサート10mg/㎡ day8-14、オンコビン1.5mg/㎡ day8.15.22.29、ビノルビン25mg/㎡ day8.9、 エンドキサン1200mg/㎡ day10、ロイナーゼ6000単位/㎡ day15.17.19.21.23.25.27.29、プレドニン錠40mg/㎡ day15-28、プレドニン錠10mg/㎡ day29-31 【髄注】メソトレキセート髄注12mg/body day1、メソトレキセート12mg/body・キロサイド30mg/body・ソルコーテフ25mg/body day8.(11).(15).22

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●) (day)

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	～35
1	なし	生食20mL	1 本 / body		●																															
	髄注	メソトレキセート注	12 mg / body		●																															
			/																																	
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body									●	●	●	●	●	●	●																		
	点滴静注	デキサート注	10 mg / ㎡	60 分								●	●	●	●	●	●	●																		
			/																																	
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分															●							●							●			
	点滴静注																																			
		ルートキープ用	/																																	
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body									●							●							●							●			
	点滴静注	オンコビン注	1.5 mg / ㎡	5 分								●							●							●							●			
			/																																	
	最大投与量は2mg/body/回																																			
5	主ルート	生食100mL	1 本 / body									●	●																							
	点滴静注	ビノルビン注	25 mg / ㎡	60 分								●	●																							
			/																																	
6	主ルート	生食500mL	1 本 / body											●																						
	点滴静注	エンドキサン注	1200 mg / ㎡	60 分										●																						
		閉鎖式システム使用	/																																	
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分																	●		●		●		●		●		●					
	点滴静注		/																																	
			/																																	
8	主ルート	生食500mL	1 本 / body																●		●		●		●		●		●		●		●			
	点滴静注	ロイナーゼ注	6000 単位 / ㎡	4 時間															●		●		●		●		●		●		●		●			
		注射用水100mL	1 本 / body																																	
9	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分								●	●	●					●		●		●		●	●	●		●		●		●			
	点滴静注		/																																	
			/																																	
10	なし	生食20mL	1 本 / body									●			●				●							●										
	髄注	メソトレキセート注	12 mg / body									●			●				●							●										
		キロサイド注	30 mg / body									●			●				●							●										
		ソルコーテフ注100mg	0.25 本 / body									●			●				●							●										
	中枢神経病変陰性時は、day11,15の髄注はしない。																																			
11		プレドニン錠5mg	60 mg / ㎡		●	●	●	●	●	●	●																									
	経口投与		/																																	
			/																																	
	分2 医師の指示通り																																			
12		プレドニン錠5mg	40 mg / ㎡																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	経口投与		/																																	
			/																																	
	分3 医師の指示通り																																			
13		プレドニン錠5mg	10 mg / ㎡																														●	●	●	
	経口投与		/																																	
			/																																	
	分3 医師の指示通り																																			

【投与上の注意】