レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年11月5日	使用開始日			
登録診療科	泌尿器科	申請医師	吉田栄宏	化学療法委員会承認年月	平成　30 年　12 月
レジメン名	オプジーボ＋ヤーボイ併用療法（オプジーボ単独2週毎投与）（腎細胞がん）				
疾患名	腎細胞がん	適応の備考	化学療法未治療のintermediate又はpoorリスクの腎細胞がん		
適応分類	根治切除不能・転移性				
1コース日数	14 日間	総コース数	有効な限り　コース	催吐性リスク	最小度
抗がん剤投与量・投与日	オプジーボ　240mg/body				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　（day）

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	点滴静注		/															
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●													
	点滴静注	オプジーボ	240 mg / body	30 分	●													
			/															
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	点滴静注		/															

【投与上の注意】
このレジメンは、オプジーボ＋ヤーボイ併用療法を4回施行後に使用する。
オプジーボ：0．22または0．2μmのインラインフィルターを使用して投与する。
オプジーボ：希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。
オプジーボ：希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。