

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021/10/5	使用開始日	
登録診療科	泌尿器科	申請医師	吉田 栄宏
レジメン名	パドセブ(尿路上皮がん)		
疾患名	尿路上皮がん	適応の備考	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん
適応分類	進行・再発		PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のある患者に使用すること
1コース日数	28	日間	総コース数
			有効な限り コース 催吐性リスク 最少度
抗がん剤投与量・投与日 パドセブ day1,8,15			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●								●												
	点滴静注																															
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●								●												
	点滴静注	パドセブ	1.25 mg / kg	30 分	●							●								●												
			注射用水100mL	1 本 / body		●							●								●											
最大投与量は125mg/body/回を超えないこと。																																
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●								●												
	点滴静注																															

【投与上の注意】

パドセブ:希釈後の最終濃度を0.3~4.0mg/mLとする。

【減量の目安】

減量段階	投与量
通常投与量	1.25mg/kg (最大 125mg)
1 段階減量	1.0mg/kg (最大 100mg)
2 段階減量	0.75mg/kg (最大 75mg)
3 段階減量	0.5mg/kg (最大 50mg)