

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年10月29日		使用開始日		
登録診療科	消化器内科・外科		申請医師	檜原啓之	
レジメン名	化学療法委員会承認年月 年 月				
疾患名	オプジーボ+ヤーボイ併用療法(オプジーボ単独4週毎投与)(結腸・直腸がん)				
適応分類	大腸がん		適応の備考	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸がん	
1コース日数	28 日間		総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最小度	
抗がん剤投与量・投与日 オプジーボ 480mg/body day1					
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●
	点滴静注	オプジーボ	480 mg / body	30 分	●
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●
	点滴静注		/		

【投与上の注意】

このレジメンは、オプジーボ+ヤーボイ併用療法を4回施行後に使用する。

オプジーボ: 0. 22または0. 2μ mのインラインフィルターを使用して投与する。

オプジーボ: 希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。

オプジーボ: 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。