レジメン登録フォーマット 申請年月日 |

下明十万日	11/1174/7/2011	区川岡和口					_
登録診療科	消化器外科	申請医師	小林照之	化学療法委員会承認年月	4	月	
レジメン名	オプジーボ+ヤーボイ併用療法(食道か	ヾ ん)					
疾患名	食道がん	適応の備考					
適応分類	根治切除不能 進行・再発	週心の哺布					
1コース日数	42 日間	総コース数		催吐	性リスク 最小	度	
	・投与日∥オプジーボ 240mg/body day1	l、day15、day2	9、ヤーボイ 1mg/	kg day1			
治療スケジュール	・投与日程(投与日は●)		(day)				

Then could be to the found and the could and the could and the could be cou																																								
治療ス	大大																																							
投与順	ルート・方法	ま 薬剤名	1 1	役 与	量	投与時間	1 1	2 3	4 5	6 7	8	9 10	11	12	13	14 1	5 16	3 17	18	19 2	20 21	1 22	23	24	25 26	27	28	29 3	30 3	1 3	2 3	3 34	35	36	37 3	38 3	39 4	0 41	42	
	主ルート	生食50mL	1	本	/ body	5 分	•							I		•	<u> </u>						ļ <u>.</u>					•					\prod							
1	■点滴静注	<u> </u>			<u>/</u>	ļ					l			ļļ									ļļ										!	ļļ						ļl
	 			.l		L					·			· 									 -				·····-						.+!	ļ						ļ
	主ルート	生食100mL	1	本	/ body		•	+	+		H	+	-		+	•	•	+	\dashv	+		+			+	+		•		+	+	+	+	\vdash	+	+	+	+	+	Н
2	点滴静注		240	mg		30 分	•				11			†*****		•							††					•					1	ļ						·····
4	从何野江				/]]																						Ţ'							
	<u> </u>						$\perp \perp$	$\perp \perp$	\perp			_		Ш	_			\perp	_						_			_				┷	₩'	Ш		_	\bot	\bot	┷	Ш
	主ルート	生食50mL		本	/ body	30 分								ļļ									ļļ										!	ļļ						ļl
3	点滴静注	=		ļ							- -			+									 -				·····						.+!	ļ						ļ
	 		1	.i	<i>/</i>	I	+				·····			tt									 				·····						+	····						·····
	主ルート		0.4	本	/ body		•																										\Box							
4	点滴静注	ヤーボイ	1	mg	/ kg	30 分	•]			I																			Ţ'							[]
'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<u></u>	<u>/</u>	l								ļļ									ļļ				ļļ.						!							ļ
	+ 11 L	生食30mL抜く 生食50mL	1 4	-	/	5 分	+	++	+	_	\vdash	+	+	\vdash	+	-	+	+	\dashv	+	+	+	\vdash		+	+	\vdash	•	_	+	+	+	₩	$\vdash \vdash$	+	+	+	+	+-	$\vdash\vdash$
	主ルート	工及30ML		本	/ body	J					·			·+ -			!						ļ -				ļ <u>.</u>	≖					!	ļļ						ļ
5	点滴静注	<u> </u>		ļ		ļ					·····			 									 -				ļ <u>ļ</u> .													ļ
1	II	1	I .	:	/	I	1 1	1 1	- i - I		1 1	- 1	1	1 1	- 1		- 1	ı I	- 1	- 1	- 1	1	1		- 1	1	1			- 1	- 1	- 1		1 1			- 1	- 1	1	1 1

【投与上の注意】

オプジーボ: 0. 22または 0. 2μmのインラインフィルターを使用して投与する。

会和4年7日26日

オプジーボ: 希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。

|使田盟始日||

オプジーボ:希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。

ヤーボイ: 0.2~1.2μmのインラインフィルターを使用して投与する。

ヤーボイ: 希釈後の最終濃度は1~4mg/mLとする。体重30kg以上の場合生食20mLに希釈する。

【減量基準】

ヤーボイ

- ・Grade 2の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く), Grade 3の皮膚障害, 症候性の内分泌障害 処置: Grade 1以下又はベースラインに回復するまで投与を延期する。内分泌障害については, 症状が回復するまで投与を延期する。 上記基準まで回復しない場合は, 投与を中止する。
- ・Grade 3以上の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く),局所的な免疫抑制療法が有効でないGrade 2以上の眼障害,Grade 4の皮膚障害処置:投与を中止する。