

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	
レジメン名	ペバシズマブ+パクリタキセル(乳癌)		
疾患名	乳がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日 パクリタキセル90mg/m ² day1.8.15、ペバシズマブ10mg/kg day1.15			

治療スケジュール・投与日程（投与日は●）				(day)																													
投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●							●							●														
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●							●							●														
		ファモチジン注20mg	1 本 / body		●								●							●													
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●							●														
	点滴静注	パクリタキセル注	90 mg / m ²	60 分	●							●							●														
			/																														
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●														●														
	点滴静注	ペバシズマブ注	10 mg / kg	90 分	●														●														
			/																														
投与速度は1回目90分、2回目60分、3回目以降30分。																																	
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●														
	点滴静注		/																														
			/																														
5		レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●							●							●														
	経口投与		/																														
			/																														
パクリタキセル投与の30分前																																	

【投与上の注意】

ペバシズマブ:希釈は生食のみ。

ペバシズマブ:投与速度は1回目90分、2回目60分、3回目以降30分。

パクリタキセル:前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。

パクリタキセル:DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。

パクリタキセル:アルコール不耐症がないことを確認する。