

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年3月23日	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美	化学療法委員会承認年月	2020 年 4 月
レジメン名	ビーリンサイト(体重45kg以上)(神経学的事象出現時) 1-5サイクル目【計5回】				
疾患名	B細胞性急性リンパ性白血病	適応の備考	再発又は難治性のB細胞性急性リンパ性白血病 神経学的事象が出現した場合に用いる		
適応分類	進行・再発、寛解導入療法、 地固め療法				
1コース日数	42 日間	総コース数	5	コース	催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日					
ビーリンサイト9μg/day day1～28					

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	～	42
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●																														
	点滴静注	デキサート注6.6mg	2 本 / body		●																														
		デキサート注1.65mg	2 本 / body		●																														
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body	48 時間	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	点滴静注	生食20mL	1 本 / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		注射用水20mL	1 本 / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ビーリンサイト	20.66 μg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1日あたりの投与量は9μg																																			

【投与上の注意】

- ・神経学的事象が出現した場合は、このレジメンを用いる。
- ・ビーリンサイト: 投与速度は、投与時間が24時間の場合は10mL/hr、48時間の場合は5mL/hrとする。
- ・ビーリンサイト: 設定した時間が経過したら、残破棄して新しいものに交換すること(残破棄せず全量投与すると過量投与となるため)。
- ・ビーリンサイト: 投与ルートは薬剤溶解液で満たしておく。
- ・ビーリンサイト: 輸液バッグ交換時や投与終了時にフラッシュを行わないこと。
- ・0.2μmのインラインフィルターを使用して投与すること。

【調製手順】

- ①生食250mLバッグに生食20mLを加え、合計270mLとする
- ②①で調製した生食バッグに輸液安定化剤5.5mLを泡立たないように注入、攪拌する
- ③新しいシリンジを用い、ビーリンサイト1Vにつき注射用水3mLで溶解(この時、振らずにゆっくりと攪拌)し、必要量をとる