レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和3年9月22日	使用開始日			
登録診療科	乳腺外科	申請医師	小西　宗治	化学療法委員会承認年月	年　月
レジメン名	【分割】キイトルーダ+PTX①				
疾患名	乳がん	適応の備考	PD-L1陽性（CPS≧10）のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌		
適応分類	進行再発				
1コース日数	分割レジメン 21日間（1コース84日間）	総コース数	コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	キイトルーダ200mg/body　day1　パクリタキセル90mg/㎡　day1、8、15				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　　（day）

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1　本 / body	5　分	●																				
	点滴静注		/																						
			/																						
2	主ルート	生食100mL	1　本 / body		●																				
	点滴静注	キイトルーダ	200　mg / body	30　分	●																				
			/																						
3	主ルート	生食50mL	1　本 / body		●							●							●						
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1　本 / body	30　分	●							●							●						
		ファモチジン注20mg	1　本 / body		●							●							●						
4	主ルート	生食250mL	1　本 / body		●							●							●						
	点滴静注	パクリタキセル	90　mg / ㎡	60　分	●							●							●						
			/																						
5	主ルート	生食50mL	1　本 / body	5　分	●							●							●						
	点滴静注		/																						
			/																						
6		レスタミンコーワ錠	5　錠 / body		●							●							●						
	経口投与		/																						
			/																						
	パクリタキセル投与の30分前																								

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。（例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。）

【投与上の注意】

キイトルーダ+PTXの分割レジメン：①～④の全84日間を1コースとする。キイトルーダは200mgを3週に1回投与、パクリタキセルは3投1休

キイトルーダ：0．2～5μmのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ：希釈後の最終濃度を1～10mg/mLとする。

キイトルーダ：Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間（±30分）に以下の薬剤で前処置を行う。

・レスタミン5錠経口投与（又は同等の抗ヒスタミン薬）

・アセトアミノフェン500～1,000mg経口投与（又は同等の解熱剤）

パクリタキセル：前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。

パクリタキセル：DEHPフリー（フィルターつき）点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。

パクリタキセル：アルコール不耐症がないことを確認する。