

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2023年3月15日	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	森田 香織
レジメン名	イジユド+イミフィンジ(肝細胞がん)(初回)		
疾患名	肝細胞がん	適応の備考	肝細胞がん
適応分類	進行再発		1コース終了後は、イミフィンジ単剤(肝細胞がん)を用いる
1コース日数	28	日間	総コース数
			1 コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日	イジユド300mg/body(体重30kg以下の場合4mg/kg) day1、イミフィンジ1500mg/body(体重30kg以下の場合20mg/kg) day1		

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		(day)																														
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート																															
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body	1 時間	●																											
	点滴静注	イジユド	300 mg / body		●																											
		体重30kg以下の場合、1回投与量は4mg/kg(体重)とする																														
3	主ルート																															
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body	1 時間	●																											
	点滴静注	イミフィンジ	1500 mg / body		●																											
		体重30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kg(体重)とする																														
5	主ルート																															
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

イジユド: 0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用して投与する。

イジユド: 希釈後の最終濃度を0.1~10mg/mLとする。

イジユド: 希釈は生食又は5%ブドウ糖液のみ。

イミフィンジ: 0.2又は0.22µmのインラインフィルターを使用して投与する。

イミフィンジ: 希釈後の最終濃度を1~15mg/mLとする。

イミフィンジ: 希釈は生食又は5%ブドウ糖液のみ。