

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成 年 月
レジメン名	ALL202-0 地固め第2コース(C2)A(50歳以上)				
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考			
適応分類	地固め療法				
1コース日数	21	日間	総コース数	コース	催吐性リスク 中等度
抗がん剤投与量・投与日	メトレキセート1500mg/m ² day1.15、オンコビン1.3mg/m ² day1.15、ロイケリン散25mg/m ² day1-21、 【随注】メトレキセート15mg/body、デキサメタゾン4mg/body day1.15				

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	グラニセトン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●															●					
	点滴静注																								
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●															●					
	精密持続静注	メトレキセート注	1500 mg / m ²	24 時間	●															●					
50歳以上では1500mg/m ² へ減量する																									
3	側管	生食100mL	1 本 / body		●															●					
	点滴静注	オンコビン注	1.3 mg / m ²	30 分	●															●					
最大投与量は2mg/body/回を超えないこと																									
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●														●	●				
	点滴静注																								
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body			●															●				
	点滴静注	アイソボリン点滴静注用 ロイコボリン注として50mg/body	25 mg / body	5 分		●															●				
メトレキセート投与開始36時間後に投与																									
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body			●	●														●	●			
	点滴静注	アイソボリン点滴静注用 ロイコボリン注として15mg/m ²	7.5 mg / m ²	5 分		●	●														●	●			
Rp5の後、6時間毎に計7回投与する																									
7	なし	生食20mL	1 本 / body		●															●					
	随注	メトレキセート注 デキサート注1.65mg	15 mg / body 2 本 / body		●															●					
		ロイケリン散	25 mg / m ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	経口投与																								
	分1 眠前																								

【投与上の注意】

メトレキセートの血中濃度を測定する