

レジメン登録フォーマット

治療スケジュール：投与日程（投与日は●） (day)

【投与上の注意】

- ・神経学的事象出現時は、ビーリンサイト(神経学的事象出現時)のレジメンを用いること。
 - ・ビーリンサイト：投与速度は、投与時間が24時間の場合は10mL/hr、48時間の場合は5mL/hrとする。
 - ・ビーリンサイト：設定した時間が経過したら、残破棄して新しいものに交換すること(残破棄せず全量投与すると過量投与となるため)。
 - ・ビーリンサイト：投与ルートは薬剤溶解液で満たしておく。
 - ・ビーリンサイト：輸液バッグ交換時等にフラッシュを行わないこと(カテーテルロックの際のフラッシュ等は許容)。
 - ・ビーリンサイト：ビーリンサイト投与後の直接のヘパリンロックは禁止(ヘパリンロック前に生食でフラッシュすること)。
 - ・0.2μmのインラインフィルターを使用して投与すること。

【調製手順】

- ①生食250mLバッグに生食20mLを加え、合計270mLとする
 - ②①で調製した生食バッグに輸液安定化剤5.5mLを泡立たないように注入、攪拌する
 - ③新しいシリンジを用い、ビーリンサイト1Vにつき注射用水3mLで溶解(この時、振らずにゆっくりと攪拌)し、必要量をとる
※調製後、バックスパイクは刺さずに払出すこと